

2004 年北京市中学生数学竞赛(高一)

初 赛

一、选择题(每小题 6 分,共 36 分)

1. 满足条件 $f(x^2) = [f(x)]^2$ 的二次函数是().

- (A) $f(x) = x^2$
 (B) $f(x) = ax^2 + 5$
 (C) $f(x) = x^2 + x$
 (D) $f(x) = -x^2 + 2004$

2. 在 \mathbf{R} 上定义的函数 $y = \sin x$, $y = \sin|x|$, $y = \sin 2004$, $y = \sin\left(\frac{1}{2} - x\right)$ 中,偶函数的个数是().

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 方程 $||x| - 1| = a$ 恰有三个实数解,则 a 等于().

- (A) 0 (B) 0.5 (C) 1 (D) $\sqrt{2}$

4. 实数 a, b, c 满足 $a + b > 0, b + c > 0, c + a > 0$, $f(x)$ 是 \mathbf{R} 上的奇函数,且是严格的减函数,即若 $x_1 < x_2$,就有 $f(x_1) < f(x_2)$. 则().

- (A) $2f(a) + f(b) + f(c) = 0$
 (B) $f(a) + f(b) + f(c) < 0$
 (C) $f(a) + f(b) + f(c) > 0$
 (D) $f(a) + 2f(b) + f(c) = 2004$

5. 已知 a, b, c, d 这四个正整数中, a 被 9 除余 1, b 被 9 除余 3, c 被 9 除余 5, d 被 9 除余 7. 则一定不是完全平方数的两个数是().

- (A) a, b (B) b, c (C) c, d (D) d, a

6. 正实数列 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 中, a_1, a_2, a_3 成等差数列, a_2, a_3, a_4 成等比数列,且公比不等于 1. 又 a_3, a_4, a_5 的倒数成等差数列. 则().(A) a_1, a_3, a_5 成等比数列(B) a_1, a_3, a_5 成等差数列(C) $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_3}, \frac{1}{a_5}$ 成等差数列(D) $\frac{1}{6a_1}, \frac{1}{3a_3}, \frac{1}{2a_5}$ 成等比数列

二、填空题(每小题 8 分,共 64 分)


7. 已知 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, \\ \log_{\frac{1}{3}} x, & x > 1. \end{cases}$ $f(f(f(-2004)))$ 的值等于_____.8. 已知 $a = 1 + 2 + \dots + 2004$. 则 a 被 17 除的余数为_____.9. 已知 $f(x) = x^2 + x - 1$. 若 $ab^2 = 1$, 且 $f(a^{-1}) = f(b^2) = 0$, 则 $\frac{a}{1+ab^2} =$ _____.10. 如图 1, 等腰 $\text{Rt} \triangle ABC$ 的直角顶点 C 在等腰 $\text{Rt} \triangle DEF$ 的斜边 DF 上, E 在 $\triangle ABC$ 的斜边 AB 上. 如果凸四边形 $ADCE$ 的面积等于 5 cm^2 , 那么, 凸四边形 $ABFD$ 的面积等于_____ cm^2 .

图 1

11. 若 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a^2 + b^2 = 10$, 则 $a - b$ 的取值范围是_____.12. 已知 a, b 是关于 x 的方程 $x^4 + m = 9x^2$ 的两个实根, 且满足 $a + b = 4$. 则 m 的值为_____.13. $\cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cos 80^\circ =$ _____.14. 将 2004 表为 n 个彼此不等的正整数的和. 则 n 的最大值为_____.

复 赛

一、填空题(每小题 8 分,共 40 分)

1. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$. 那么,

$$f\left(\frac{1}{2004}\right) + f(1) + f(2004) = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 化简 $(\log_3 4 + \log_3 9)^2 - (\log_3 4 - \log_3 9)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n a_{n+1} a_{n+2} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2}$, 且 $a_{n+1} a_{n+2} = 1$. 则 $a_1 + a_2 + \dots + a_{2004} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 如图 2, 已知 O_1 与 O_2 的半径分别是 2 和 4, $O_1 O_2 = 10$. 则两圆的两条内公切线与一条外公切线所围成的 MNP 的面积等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.




图 2




图 3

5. 如图 3, 四边形 $ABMN$ 、四边形 $BCKL$ 、四边形 $AC PQ$ 都是正方形. 已知 $S_{\text{正方形}ABMN} - S_{\text{正方形}BCKL} = m$ (m 是正数). 则 $NQ^2 - PK^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(15 分) 已知 $abc > 0$. 求证:

$$\frac{a^4}{4a^4 + b^4 + c^4} + \frac{b^4}{a^4 + 4b^4 + c^4} + \frac{c^4}{a^4 + b^4 + 4c^4} \geq \frac{1}{2}$$

三、(15 分) 已知 $\frac{x^2}{2} + 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$). 求

证: 关于 x 的二次方程

$$x^2 - (1 - \cos^3) x + \cos = 0,$$

$$x^2 - (1 - \sin^3) x + \sin = 0,$$

$$x^2 - \frac{\sqrt{1+\cos}}{\sqrt{1-\sin}} x + \frac{1}{4} = 0$$

中至少有一个具有两个不等的实数根.

四、(15 分) 如图

4, O, I 分别是 $\triangle ABC$ 的外心与内心, 已知

$\angle OIB = 30^\circ$. 求证: $\angle BAC = 60^\circ$.




图 4

五、(15 分) 已知

数列 $\{a_n\}$:

$$a_n = \frac{n - \sqrt{n}}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 \sqrt{n} 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根. 求证:

(1) 对任意正整数 n , 都有

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n;$$

(2) 数列 $\{a_n\}$ 中的项都是正整数, 且任意相邻两项都互质.

参 考 答 案

初 赛

一、1. A.

设 $f(x) = ax^2 + bx + c$. 代入、展开并确定 $a = 1, b = 0, c = 0$.

2. D.

根据奇函数定义与偶函数定义直接判定,

$y = \sin|x|, y = \sin 2004x, y = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 都是偶函数.

3. C.

用图像法: 画出函数 $y = ||x| - 1|$ 的图像(如图 5), 当平行于 Ox 轴的直线 $y = a$ 与函数 $y = ||x| - 1|$ 的图像恰有三个交点时, $a = 1$.




图 5

4. B.

$x \in \mathbb{R}, f(x)$ 是奇函数, 则 $f(0) = 0$. 因为 $f(x)$ 是严格的减函数, 所以, 对 $x > 0$, 有 $f(x) < 0$.

又 $a + b > 0$, 则

$$a > -b \Rightarrow f(a) < f(-b) = -f(b)$$

$$\Rightarrow f(a) + f(b) < 0.$$

同理, $f(b) + f(c) < 0, f(c) + f(a) < 0$.

$$\text{相加得 } 2[f(a) + f(b) + f(c)] < 0.$$

5. B.

设整数 x 被 9 除余 0, $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$, 则 x^2 被 9 除余 0, 1, 4, 7. 那么, 被 9 除余 2, 3, 5, 6, 8 的正整数一定不是完全平方数, 故 b, c 一定不是完全平方

数.

6. A.

$$\text{由已知得} \begin{cases} 2a_2 = a_1 + a_3, \\ a_3^2 = a_2 a_4, \\ a_3^{-1} + a_5^{-1} = 2a_4^{-1}. \end{cases}$$

$$\text{由式得} \frac{a_3 + a_5}{a_3 a_5} = \frac{2}{a_4}.$$

由式得 $a_4 = \frac{a_3^2}{a_2}$, 将其代入式, 有

$$\frac{a_3 + a_5}{a_3 a_5} = \frac{2a_2}{a_3^2} = \frac{a_1 + a_3}{a_3^2}$$

$$\Rightarrow a_3^2 + a_3 a_5 = a_1 a_5 + a_3 a_5$$

$$\Rightarrow a_3^2 = a_1 a_5.$$

二、7. $-\frac{1}{2}$.

由已知, 有 $f(-2004) = 2^{-2004} = \frac{1}{2^{2004}}$.

由于 $0 < \frac{1}{2^{2004}} < 1$, 则

$$f(f(-2004)) = f\left(\frac{1}{2^{2004}}\right) = \sqrt{3}.$$

因此, $f(f(f(-2004))) = f(\sqrt{3})$

$$= \log_{\frac{1}{3}} \sqrt{3} = -\frac{1}{2}.$$

8. 1.

$$a = 1 + 2 + \dots + 2004$$

$$= \frac{2004 \times 2005}{2} = 2009010.$$

则 2009010 被 17 除商 118177, 余 1.

9. -1.

$$\text{由 } f(x) = x^2 + x - 1, f(a^{-1}) = f(b^2) = 0, ab^2 = 1$$

知 a^{-1}, b^2 是 $f(x) = x^2 + x - 1$ 的两个实根.

$$\text{由韦达定理得} \frac{1}{a} + b^2 = -1, \frac{b^2}{a} = -1.$$

$$\text{则} \frac{1}{a} + b^2 = \frac{b^2}{a} = -1.$$

于是, 有 $1 + ab^2 = -a$.

10. 10.

凸四边形 $ECFB$ 与凸四边形 $ADCE$ 中, 对角线 $BC = AC, EF = DE$. 由于 $\angle OCP = \angle PEO = 90^\circ$, 则

$$\angle EOC + \angle EPC = 180^\circ.$$

从而, $\sin \angle EOC = \sin \angle EPC$.

$$\text{所以, } S_{\text{四边形}ECFB} = \frac{1}{2} EF \cdot BC \sin \angle EPC$$

$$= \frac{1}{2} DE \cdot AC \sin \angle EOC = S_{\text{四边形}ADCE} = 5 \text{ cm}^2.$$

故 $S_{\text{四边形}ABFD} = S_{\text{四边形}ADCE} + S_{\text{四边形}ECFB}$

$$= 5 + 5 = 10(\text{cm}^2).$$

11. $[-2\sqrt{5}, 2\sqrt{5}]$.

由 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $a^2 + b^2 = 10$, 得

$$(a - b)^2 = 2(a^2 + b^2) - (a + b)^2$$

$$2(a^2 + b^2) = 20.$$

则 $|a - b| \leq 2\sqrt{5}$.

12. 12.25.

方程可化为 $x^4 - 9x^2 + m = 0$. 则 a^2, b^2 是 $y^2 -$

$9y + m = 0$ 的根, 其中 $y = x^2$. 由韦达定理, 得

$$a^2 + b^2 = 9, a^2 b^2 = m.$$

又 $a + b = 4$, 则 $(a + b)^2 = 16$, 可得 $ab = \frac{7}{2}$.

13. $\frac{1}{16}$.

$$\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$$

$$= \frac{2 \sin 20^\circ \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ}{2 \sin 20^\circ}$$

$$= \frac{2 \sin 40^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ}{4 \sin 20^\circ}$$

$$= \frac{2 \sin 80^\circ \cos 80^\circ \cdot \cos 60^\circ}{8 \sin 20^\circ} = \frac{\sin 160^\circ}{16 \sin 20^\circ} = \frac{1}{16}.$$

14. 62.

将 2004 表为 n 个彼此不等的正整数的和. 要 n 最大, 只须写成从 1 开始的连续的自然数的和即可.

由 $1 + 2 + \dots + n = 2004$, 得

$$\frac{n(n+1)}{2} = 2004.$$

整理得 $n^2 + n - 4008 = 0$.

解得 $n = 62$.

复 赛

一、1. $\frac{3}{2}$.

若 $ab = 1$, 则

$$f(a) + f(b) = \frac{a^2}{1+a^2} + \frac{b^2}{1+b^2}$$

$$= \frac{1+a^2+1+b^2}{1+a^2+b^2+a^2b^2} = 1.$$

$$\text{于是, } f(1) = \frac{1}{2}, f(2004) + f\left(\frac{1}{2004}\right) = 1.$$

$$\text{所以, } f\left(\frac{1}{2004}\right) + f(1) + f(2004) = \frac{3}{2}.$$

2. 16.

$$(\log_3 4 + \log_3 9)^2 - (\log_3 4 - \log_3 9)^2$$

$$= 4 \log_3 4 \cdot 4 \log_3 9 = 4 \times \frac{\lg 4}{\lg 3} \times \frac{\lg 9}{\lg 2}$$

$$= 4 \times \frac{2 \lg 2}{\lg 3} \times \frac{2 \lg 3}{\lg 2} = 16.$$

3. 4008.

将 $a_1 = 1, a_2 = 2$ 代入 $a_n a_{n+1} a_{n+2} = a_n + a_{n+1} +$

a_{n+2} , 得 $a_3 = 3$.

由 $a_n a_{n+1} a_{n+2} = a_n + a_{n+1} + a_{n+2}$,

$a_{n+1} a_{n+2} a_{n+3} = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}$,

相减得 $(a_{n+3} - a_n)(a_{n+1} a_{n+2} - 1) = 0$.

由于 $a_{n+1} a_{n+2} \neq 1$, 所以, $a_{n+3} = a_n$.

因此, 数列 $\{a_n\}$ 是周期数列.

故 $a_1 + a_2 + \dots + a_{2004}$

$$= (a_1 + a_2 + a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + \dots + (a_{2002} + a_{2003} + a_{2004})$$

$$= (1 + 2 + 3) \times 668 = 4\ 008.$$

4. $\frac{32}{3}$.

如图 6, 求得外公切线 $AB = 4\sqrt{6}$, 内公切线 $CD = EF = 8$, $O_1 P = \frac{10}{3}$, $O_2 P = \frac{20}{3}$. 由勾股定理计算得




图 6

$$PC = PF = \frac{8}{3}, PD = PE = \frac{16}{3}.$$

设 $MA = MF = x$, $ND = NB = y$.

由切线长定理得 $MB = ME$.

于是, $AB - x = 8 + x$. 所以, $x = 2\sqrt{6} - 4$.

同理可得 $y = 2\sqrt{6} - 4$.

此时, 计算得

$$S_{\text{梯形}AO_1O_2B} = \frac{(2+4) \times 4\sqrt{6}}{2} = 12\sqrt{6}.$$

$$S_{\text{四边形}AO_1FM} = 2(2\sqrt{6} - 4),$$

$$S_{\text{四边形}BO_2DN} = 4(2\sqrt{6} - 4),$$

$$S_{\triangle O_1PF} = \frac{8}{3}, S_{\triangle O_2PE} = \frac{32}{3}.$$

$$\text{故 } S_{\triangle MIN} = 12\sqrt{6} - 2(2\sqrt{6} - 4) - 4(2\sqrt{6} - 4) - \frac{8}{3} - \frac{32}{3} = \frac{32}{3}.$$

5. 3 m.

$$NQ^2 = AN^2 + AQ^2 - 2AN \cdot AQ \cos \angle NAQ$$

$$= AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \angle NAQ,$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \angle BAC.$$

因为 $\angle NAQ + \angle BAC = 180^\circ$,

$$\cos \angle NAQ = -\cos \angle BAC,$$

所以, $NQ^2 + BC^2 = 2AB^2 + 2AC^2$.

类似可得 $PK^2 + AB^2 = 2BC^2 + 2AC^2$.

故 $NQ^2 - PK^2 = 3AB^2 - 3BC^2 = 3m$.

二、因为 $4a^4 + b^4 + c^4 = 2a^4 + a^4 + b^4 + a^4 + c^4$

$$\text{所以, } \frac{2a^4 + 2a^2b^2 + 2a^2c^2}{4a^4 + b^4 + c^4} = \frac{a^4}{2a^4 + 2a^2b^2 + 2a^2c^2}$$

$$= \frac{a^2}{2(a^2 + b^2 + c^2)}.$$

$$\text{同理可得 } \frac{b^4}{a^4 + 4b^4 + c^4} = \frac{b^2}{2(a^2 + b^2 + c^2)},$$

$$\frac{c^4}{a^4 + b^4 + 4c^4} = \frac{c^2}{2(a^2 + b^2 + c^2)}.$$

三式相加得

$$\frac{a^4}{4a^4 + b^4 + c^4} + \frac{b^4}{a^4 + 4b^4 + c^4} + \frac{c^4}{a^4 + b^4 + 4c^4}$$

$$= \frac{a^2}{2(a^2 + b^2 + c^2)} + \frac{b^2}{2(a^2 + b^2 + c^2)} + \frac{c^2}{2(a^2 + b^2 + c^2)}$$

$$= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2(a^2 + b^2 + c^2)} = \frac{1}{2}.$$

当 $a = b = c = 0$ 时, 上式等号成立.

三、将三个方程的判别式分别记为 $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$, 则

$$\Delta_1 = (1 - \cos^3)^2 - 4 \cos^3,$$

$$\Delta_2 = (1 - \sin^3)^2 - 4 \sin^3,$$

$$\Delta_3 = \left(\frac{1 + \cos}{\sqrt{1 - \sin}} \right)^2 - 1.$$

显然, 如果 $\cos < 0$, 则有 $\Delta_1 > 0$. 因此, 方程 $x^2 - (1 - \cos^3)x + \cos^3 = 0$ 有两个不等的实数根.

如果 $\sin < 0$, 则有 $\Delta_2 > 0$. 因此, 方程 $x^2 - (1 - \sin^3)x + \sin^3 = 0$ 有两个不等的实数根.

如果 $\cos \geq 0$ 且 $\sin \geq 0$, 由已知 $\frac{1}{2} + 2k$

($k \in \mathbb{Z}$), $1 - \sin \geq 0$, 则 $\frac{1 + \cos}{\sqrt{1 - \sin}} > 1$. 所以,

$$\Delta_3 = \left(\frac{1 + \cos}{\sqrt{1 - \sin}} \right)^2 - 1 > 0,$$

此时, 方程 $x^2 - \frac{1 + \cos}{\sqrt{1 - \sin}}x + \frac{1}{4} = 0$ 有两个不等的实数根.

综上所述, 题设的三个方程中, 至少有一个具有两个不等的实数根.

四、如图 7, 联结 AI 并延长交 $\odot O$ 于 D, 联结 BD. 则 D 为 BC 的中点. 于是,

$$\begin{aligned} \angle BID &= \angle IBC + \angle CBD \\ &= \frac{\angle ABC}{2} + \angle CAD \\ &= \frac{\angle ABC}{2} + \frac{\angle BAC}{2}, \\ \angle BID & \end{aligned}$$




图 7

2004 年安徽省高中数学竞赛(初赛)

一、选择题(每小题 6 分,共 36 分)

1. 设 $a < b < 0$. 则下列不等关系中,不成立的是().

- (A) $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ (B) $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$
 (C) $|a| > |b|$ (D) $a^2 > b^2$

2. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(2x - x^2)$ 的单调递减区间是().

- (A) $(0, 2)$ (B) $[1, +\infty)$
 (C) $[1, 2)$ (D) $(0, 1]$

3. 已知集合 $S \subseteq \{1, 2, \dots, 26\}$, 且满足 S 中任何 2 个元素的和都不能被 5 整除. 则集合 S 中元素的个数最多是()个.

- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13

4. 已知 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 则 $\sin + \cos$ 与 1 的大小关系是().

- (A) $\sin + \cos > 1$
 (B) $\sin + \cos < 1$
 (C) $\sin + \cos = 1$
 (D) 大小与 θ 的取值有关

5. 如图 1, 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的侧面 $AA'B'B$ 内有一点 M 到两直线 $AB, B'C$ 的距离相等. 那么, M 的轨迹是().




图 1

- (A) 抛物线的一部分
 (B) 双曲线的一部分
 (C) 椭圆的一部分
 (D) 线段

6. 已知 $A(a, b), B(c, d)$, 且

$$= \angle IBA + \angle IAB = \frac{\angle ABC}{2} + \frac{\angle BAC}{2}.$$

所以, $\angle IBD = \angle BID \Rightarrow ID = BD$.

作 B 关于 OI 的对称点 A_1 , 则 A_1 在 O 上, 有

$$\angle IA_1B = \angle IB, \quad \angle OIA_1 = \angle OIB = 30^\circ.$$

所以, $\angle BIA_1 = \angle OIB + \angle OIA_1 = 60^\circ$.

因此, $\triangle A_1BI$ 是等边三角形, 有 $A_1B = A_1I$.

又 $ID = BD$, 则 A_1D 是线段 BI 的垂直平分线, 也是 $\angle BA_1I$ 的平分线.

$$\text{故 } \angle BAD = \angle BA_1D = \frac{1}{2} \angle BA_1I = 30^\circ.$$

因此, $\angle BAC = 2 \angle BAD = 60^\circ$.

五、(1) 因为 x, y 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根, 根据韦达定理, 有

$$x + y = 1, \quad xy = -1.$$

故 $x^{n+2} - x^{n+2}$

$$= (x + y)(x^{n+1} - y^{n+1}) - (x^n - y^n)$$

$$= (x^{n+1} - y^{n+1}) + (x^n - y^n).$$

$$\text{所以, } \frac{x^{n+2} - y^{n+2}}{x - y} = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{x - y} + \frac{x^n - y^n}{x - y},$$

即 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$.

(2) 对数列 $\{a_n\}$, 由

$$a_n = \frac{x^n - y^n}{x - y} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

$$\text{得 } a_1 = \frac{x - y}{x - y} = 1, \quad a_2 = \frac{x^2 - y^2}{x - y} = x + y = 1.$$

再由对任意正整数 n , 都有 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 所以, 数列 $\{a_n\}$ 中的项都是正整数.

下面证明, 任意相邻两项都互质.

如若不然, 设 $(a_{n+2}, a_{n+1}) = d > 1$. 由对任意正整数 n , 都有 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 则

$$d \mid (a_{n+2}, a_{n+1}) = (a_{n+1}, a_n) = (a_n, a_{n-1}) = \dots = (a_4, a_3) = (a_3, a_2) = (1, 1) = 1,$$

与 $d > 1$ 矛盾.

因此, 数列 $\{a_n\}$ 中任意相邻两项都互质.

(周春荔 整理)